$K^- \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^-$		$(8.2 \pm 1.4) \times 10^{-3}$		772
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^+ \pi^-$ $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		$(6.8 \pm 1.8) \times 10^{-3}$		642
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^0 \pi^+$ $\times$ B($\overline{K}^{*0} \to K^- \pi^+$)		$(5.1 \pm 2.2) \times 10^{-3}$		242
$K^- \pi^+ \pi^+ \pi^0 \pi^0$		$(2.2\ ^{+5.0}_{-0.9})$ %		775
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^+ \pi^- \pi^0$		$(5.4\ ^{+3.0}_{-1.4})$ %		773
$\overline{K}^0 \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- \pi^-$		$(8 \pm 7) \times 10^{-4}$		714
$K^- \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- \pi^0$		$(2.0 \pm 1.8) \times 10^{-3}$		718
$\overline{K}^0 \overline{K}^0 K^+$		(3.1 ± 0.7) %		545

Fractions of some of the following modes with resonances have already appeared above as submodes of particular charged-particle modes.

$\overline{K}^0 \rho^+$		(6.6 ± 2.5) %		680
$\overline{K}^0 a_1(1260)^+$		(8.1 ± 1.7) %		328
$\overline{K}^0 a_2(1320)^+$		$< 3 \times 10^{-3}$	CL=90%	199
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+$		(2.2 ± 0.4) %		712
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ total		(2.1 ± 1.4) %		423
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ *S*-wave	[kk]	(1.7 ± 1.6) %		423
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ *P*-wave		$< 1 \times 10^{-3}$	CL=90%	423
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ *D*-wave		$(10 \pm 7) \times 10^{-3}$		423
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^+$ *D*-wave longitudinal		$< 7 \times 10^{-3}$	CL=90%	423
$\overline{K}_1(1270)^0 \pi^+$		$< 7 \times 10^{-3}$	CL=90%	487
$\overline{K}_1(1400)^0 \pi^+$		(5.0 ± 1.3) %		390
$\overline{K}^*(1410)^0 \pi^+$		$< 7 \times 10^{-3}$	CL=90%	382
$\overline{K}_0^*(1430)^0 \pi^+$		(3.4 ± 0.4) %		368
$\overline{K}^*(1680)^0 \pi^+$		(1.0 ± 0.5) %		65
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^0$ total		(6.7 ± 1.4) %		687
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^0$ 3-body		(4.2 ± 1.4) %		687
$K^*(892)^- \pi^+ \pi^+$ 3-body		(2.1 ± 0.9) %		688
$K^- \rho^+ \pi^+$ total		(3.1 ± 1.1) %		616
$K^- \rho^+ \pi^+$ 3-body		(1.1 ± 0.4) %		616
$\overline{K}^0 \rho^0 \pi^+$ total		(4.2 ± 0.9) %	CL=90%	614
$\overline{K}^0 \rho^0 \pi^+$ 3-body		$(5 \pm 5) \times 10^{-3}$		614
$\overline{K}^0 f_0(980) \pi^+$		$< 5 \times 10^{-3}$	CL=90%	461
$\overline{K}^*(892)^0 \pi^+ \pi^+ \pi^-$		(1.02 ± 0.27) %		642
$\overline{K}^*(892)^0 \rho^0 \pi^+$		$(7.7 \pm 3.3) \times 10^{-3}$		242

Pionic modes

$\pi^+ \pi^0$		$(2.5 \pm 0.7) \times 10^{-3}$		925
$\pi^+ \pi^+ \pi^-$		$(3.2 \pm 0.6) \times 10^{-3}$		908
$\rho^0 \pi^+$		$< 1.4 \times 10^{-3}$	CL=90%	769
$\pi^+ \pi^+ \pi^-$ nonresonant		$(2.5 \pm 0.7) \times 10^{-3}$		908