$K_2(1580)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(2^-)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in partial-wave analysis of the $K^-\pi^+\pi^-$ system. Needs confirmation.

$K_2(1580)$ MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*CHG*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 1580	OTTER	79	–	10,14,16 $K^- p$

$K_2(1580)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*CHG*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 110	OTTER	79	–	10,14,16 $K^- p$

$K_2(1580)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	$K^*(892)\pi$	seen
Γ_2	$K_2^*(1430)\pi$	possibly seen

$K_2(1580)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K^*(892)\pi)/\Gamma_{total}$ **Γ_1/Γ**

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
seen	OTTER	79	HBC	–	10,14,16 $K^- p$

$\Gamma(K_2^*(1430)\pi)/\Gamma_{total}$ **Γ_2/Γ**

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
possibly seen	OTTER	79	HBC	–	10,14,16 $K^- p$

$K_2(1580)$ REFERENCES

OTTER 79 NP B147 1 +Rudolph+ (AACH3, BERL, CERN, LOIC, WIEN) JP